

# Lien entre Qualité de vie, TCA et obésité




De nombreuses études de la littérature ont mis en évidence une **diminution** de la **qualité de vie** et en particulier de la qualité de vie associée à la **santé** chez les patients souffrant de **TCA** ou d'**obésité**. En effet, plus les **symptômes** de TCA sont **importants**, plus la **qualité de vie** est **diminuée**. Cette diminution de la qualité de vie peut varier selon les différentes formes de TCA, notamment car elle peut être associée à la présence de **diverses comorbidités**.

Ainsi, la **prise en charge** des **comorbidités** associées aux TCA et à l'obésité pourrait impacter positivement la qualité de vie. Une étude a mis en évidence que la **dépression** (cf. *fiche anxiété*), l'addiction aux **drogues** (cf. *fiche addiction*) ou encore l'**ostéoporose**<sup>3</sup> sont les facteurs **impactant** le plus la **qualité de vie**.



L'**étude de la qualité de vie** au cours du **dépistage** et de la **prise en charge** des TCA et de l'obésité permettra ainsi d'évaluer l'impact de la pathologie.



## SOURCES :

1. Van Hoeken, D., & Hoek, H. W. (2020). Review of the burden of eating disorders: mortality, disability, costs, quality of life, and family burden. *Current Opinion in Psychiatry*, 33(6), 521.
2. Mitchison, D., Morin, A., Mond, J., Slewa-Younan, S., & Hay, P. (2015). The bidirectional relationship between quality of life and eating disorder symptoms: A 9-year community-based study of Australian women. *PLoS One*, 10(3), e0120591.
3. Martín, J., Padierna, A., Llorca, A., Muñoz, P., & Quintana, J. M. (2017). Predictors of quality of life in patients with eating disorders. *European Psychiatry*, 45, 182-189.